



บูสเตอร์สำหรับ วัคซีน COVID-19

วัคซีน COVID-19 ยังคงให้การป้องกันอย่างแข็งแกร่งต่อการเจ็บป่วยรุนแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต ปัจจุบันมีการแนะนำให้ใช้บูสเตอร์สำหรับประชาชนบางกลุ่ม

บูสเตอร์เป็นเรื่องปกติสำหรับวัคซีนหลายชนิด บูสเตอร์วัคซีน COVID-19 ช่วยให้คุณมั่นใจว่าผู้รับจะยังคงได้รับการป้องกัน COVID-19 ในระดับที่แข็งแกร่ง และช่วยลดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

วัคซีน COVID-19 ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรครุนแรง การรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต แม้จะมีความแตกต่างกันก็ตาม วัคซีน COVID-19 ทั้งหมดรวมถึงบูสเตอร์นั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆแน่นอน



หากคุณได้รับ...

วัคซีน Pfizer

แนะนำให้ใช้บูสเตอร์
ครั้งเดียว สำหรับผู้ที่อายุ
12 ปีขึ้นไปอย่างน้อย ห้า
เดือน หลังจากได้รับเข็มที่
สอง

วัคซีน Moderna

แนะนำให้ใช้บูสเตอร์
ครั้งเดียว สำหรับผู้ที่อายุ
18 ปีขึ้นไปอย่างน้อย ห้า
เดือน หลังจากได้รับเข็มที่
สอง

วัคซีน Johnson & Johnson

แนะนำให้ใช้บูสเตอร์
ครั้งเดียว สำหรับผู้รับวัคซีน
Johnson & Johnson ทุกคน
อย่างน้อย สองเดือน หลัง
จากการฉีดเข็มแรก

อนุญาตให้ฉีดวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ ทั้งหมดได้ในแบบผสมหรือแบบไขว้เพื่อใช้เป็นบูสเตอร์

บุคคลที่มีสิทธิ์สามารถเลือกชนิดของวัคซีนบูสเตอร์ที่พวกเขาได้รับได้ บางคนอาจชอบวัคซีนประเภทเดิมที่ได้รับตั้งแต่แรก และคนอื่น ๆ อาจต้องการรับวัคซีนต่างประเภท แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ วัคซีน COVID-19 ของ Pfizer หรือ Moderna เป็นที่นิยมมากกว่าวัคซีน COVID-19 ของ Johnson & Johnson เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HawaiiCOVID19.com/Vaccine