



ຢາບູດສເຕີ້ (Boosters) ສໍາລັບ ວັກຊີນ COVID-19

ວັກຊີນ COVID-19 ສືບຕໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ກັບພະຍາດ ຮ້າຍແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ການເສຍຊີວິດ. ຕອນນີ້ແນະນຳໃຫ້ຢາ ບູດສເຕີ້ ສໍາລັບບາງປະຊາກອນ.

ຢາບູດສເຕີ້ ໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ໄດ້ກັບວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດ. ຢາບູດສເຕີ້ ວັກຊີນ COVID-19 ຮັບປະກັນວ່າ ຜູ້ຮັບ ຈະສືບຕໍ່ມີລະດັບປ້ອງກັນທີ່ແຂງແຮງຕໍ່ ກັບ COVID-19 ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຜູ້ອື່ນ.

ວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດທີ່ອະນຸມັດໂດຍສະຫະລັດ ມີຜົນດີໃນການ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງ, ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ແລະ ການເສຍ ຊີວິດ, ໂດຍສະເພາະຈະຕ້ານກັບສາຍພັນຊະນິດຕ່າງ ໆ. ວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດ, ລວມທັງຢາບູດສເຕີ້, ແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ.



ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບ ...

ວັກຊີນ Pfizer

ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາບູດສເຕີ້ ແບບ ຄັ້ງດຽວ ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າເດືອນ ຫຼັງຈາກຮັບຢາຄັ້ງທີສອງ.

ວັກຊີນ Moderna

ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາບູດສເຕີ້ ແບບ ຄັ້ງດຽວ ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປຢ່າງໜ້ອຍ ຫ້າເດືອນ ຫຼັງຈາກຮັບຢາຄັ້ງທີສອງ.

ວັກຊີນ Johnson & Johnson

ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢາບູດສເຕີ້ ຄັ້ງດຽວ ສໍາລັບຜູ້ຮັບ Johnson & Johnson ທັງໝົດຢ່າງໜ້ອຍ ສອງເດືອນ ຫຼັງຈາກຮັບຢາຄັ້ງທຳອິດ.

ອະນຸຍາດໃຫ້ການປະສົມ ແລະ ການຈັບຄູ່ວັກຊີນ COVID-19 ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະຫະລັດ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຢາບູດສເຕີ້.

ບຸກຄົນທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດເລືອກຢາວັກຊີນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບເປັນການສັກຢາບູດສເຕີ້. ບາງຄົນອາດຈະມັກຊະນິດວັກຊີນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄົນອື່ນອາດຈະມັກສັກຢາວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ອື່ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສໍາລັບຄົນສ່ວນໃຫຍ່, ວັກຊີນ Pfizer ຫຼື Moderna COVID-19 ແມ່ນເປັນທີ່ມັກຫຼາຍກວ່າວັກຊີນ Johnson & Johnson COVID-19 ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຫດການຮ້າຍແຮງ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າເບິ່ງ HawaiiCOVID19.com/Vaccine