

Puntos de discusión: Los CDC advierten sobre los casos de "rebote" de Paxlovid

- **Algunas personas han informado que se han recuperado de COVID-19 después de tomar Paxlovid pero que han vuelto a dar positivo entre dos y ocho días después.**
 - Los síntomas durante la infección de rebote parecen ser leves o inexistentes, pero las personas infectadas siguen corriendo el riesgo de transmitir el virus a otras personas.
 - No está claro por qué se producen los casos de rebote. Una de las hipótesis es que Paxlovid [puede no eliminar totalmente la infección](#) en el periodo de tratamiento de cinco días. El virus del COVID-19 que permanece en el cuerpo después de terminar el tratamiento podría empezar a replicarse y hacer que las personas vuelvan a dar positivo.
 - Pfizer afirma que sus estudios muestran que alrededor del 2 por ciento de las personas que toman Paxlovid experimentan un efecto rebote de COVID-19, pero algunos profesionales de la salud creen que la tasa es mucho mayor.
- **Paxlovid sigue siendo un tratamiento muy eficaz contra el COVID-19 que evita la hospitalización y la muerte.**
 - Los CDC siguen recomendando Paxlovid para las personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.
 - Para que se le recete Paxlovid, uno debe tener una prueba positiva, ser considerado de alto riesgo y comenzar el régimen dentro de los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas.
 - Utilice [este localizador](#) para encontrar un sitio donde pueda hacerse la prueba y recibir el tratamiento en un mismo lugar.
 - Si tiene un seguro médico y un proveedor de atención primaria, puede solicitar una cita para hacerse la prueba o compartir el resultado positivo de la misma y obtener una prescripción.
 - Las opciones de telesalud a través de plataformas como [PlushCare](#) y [eMed](#) ofrecen visitas en línea para valorar las pruebas y los síntomas del COVID-19 y prescribir medicamentos.
- **Las personas que experimentan el "rebote de Paxlovid" deben volver a aislarse durante al menos cinco días.**
 - Si experimenta una reaparición de los síntomas de COVID-19 después de tomar Paxlovid, hágase una prueba y use una mascarilla. Si la prueba es positiva, siga [las recomendaciones de aislamiento de los CDC](#).
 - Aunque los CDC recomiendan el aislamiento durante cinco días, muchas personas siguen siendo infecciosas después de este periodo. La opción más segura es [aislarse hasta recibir una prueba rápida negativa](#) o usar una mascarilla si tiene que abandonar el aislamiento antes.
 - Los CDC no recomiendan volver a tomar Paxlovid si experimenta un rebote de COVID-19.

Preguntas frecuentes sobre los casos de "rebote de Paxlovid"

1. ¿Por qué se producen infecciones de rebote después de tomar Paxlovid?

Se necesita más investigación para determinar la causa de estos casos de rebote, pero una hipótesis es que Paxlovid [puede no eliminar totalmente la infección](#) en el periodo de tratamiento de cinco días. Si todavía queda algún virus del COVID-19 en el cuerpo después de terminar el tratamiento, esos restos de virus podrían empezar a replicarse y hacer que las personas vuelvan a dar positivo. Pfizer afirma que sus estudios muestran que alrededor del 2 por ciento de las personas que toman Paxlovid experimentan un efecto rebote de COVID-19, pero algunos profesionales de la salud creen que la tasa es mucho mayor.

2. ¿Sigue siendo eficaz el Paxlovid?

Paxlovid sigue siendo una opción de tratamiento extremadamente eficaz a pesar de estas preocupaciones. El fármaco tiene una eficacia de casi el 90 por ciento en la prevención de la hospitalización y la muerte por COVID-19 entre las personas de alto riesgo no vacunadas. Los CDC han advertido del fenómeno de rebote, pero aclaran que siguen recomendando Paxlovid para las personas con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

3. ¿Qué debo hacer si experimento un caso de "rebote"?

Según la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, si las personas experimentan una reaparición de los síntomas del COVID-19 después de tomar Paxlovid, "deben hacerse la prueba. Deben volver a ponerse una mascarilla. Y si su prueba es positiva, reiniciar el protocolo de aislamiento". La agencia no recomienda que las personas vuelvan a tomar el régimen de cinco días de Paxlovid si experimentan un rebote de COVID-19.

Según [las directrices de aislamiento de los CDC](#), las personas que reciban un resultado positivo deben permanecer en casa y aislarse de los demás durante al menos cinco días. Muchas personas siguen siendo infecciosas después del periodo de cinco días, por lo que la opción más segura es [aislarse hasta recibir una prueba rápida negativa](#) o usar una mascarilla si tiene que dejar el aislamiento sin una prueba negativa.